



КАК ИЗБЕЖАТЬ УКУСА КЛЕЩА

ОПАСНЫЕ МЕСТА

(ЗДЕСЬ ВЕРОЯТНОСТЬ УКУСА КЛЕЩА ОСОБЕННО ВЫСОКА)



ЛЕС



парк



ДАЧНЫЕ
УЧАСТКИ



САДОВО-ОГОРОДНЫЕ
УЧАСТКИ

ОДЕЖДА ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПРОГУЛКИ

- СВЕТЛАЯ, ОДНОТОННАЯ
- ГОЛОВА И ШЕЯ- ЗАКРЫТЫ (ГОЛОВНОЙ УБОР, КАПЮШОН, КОСЫНКА)
- РУКИ И НОГИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫ (ДЛИННЫЕ РУКАВА И БРЮКИ)
- РУКАВА- С ПЛОТНЫМИ МАНЖЕТАМИ
- РУБАШКА ЗАПРАВЛЕНА В БРЮКИ, БРЮКИ- В НОСКИ
- ОБУВЬ- С ВЫСОКИМ ГОЛЕНИЩЕМ

ВАЖНО

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
ОБРАБОТАТЬ
ОДЕЖДУ И ОБУВЬ
АКАРИЦИДНЫМ
СРЕДСТВОМ
(ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ-
ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ИНСТРУКЦИЕЙ)



ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ



- УПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРОГО МОЛОКА КОЗ, ОВЕЦ, И ПРОДУКТОВ ИЗ НЕГО ПРИГОТОВЛЕННЫХ
- РАЗДАВЛИВАНИЕ КЛЕЩА, РАСЧЕСЫВАНИЕ МЕСТА УКУСА КЛЕЩА

СИМПТОМЫ



- ОСТРОЕ НАЧАЛО
- ЖАР
- ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
- МЫШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ И БОЛИ
- ТОШНОТА

ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ

- ПРОВОДИТЬ САМО И ВЗАИМООСМОТР КАЖДЫЕ 15-20 МИНУТ
- НЕ САДИТЬСЯ НА ТРАВУ
- ИЗБЕГАТЬ МЕСТ С ГУСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЫСОКОЙ ТРАВой
- НЕ ПРИНОСИТЬ ДОМОЙ РАСТЕНИЯ, СОБРАННЫЕ В ЛЕСУ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА

- НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КЛЕЩА КАК МОЖНО СКОРЕЕ
- ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ
- СНЯТОГО КЛЕЩА-ДОСТАВИТЬ НА ИССЛЕДОВАНИЕ В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ